


Odvzem krvi v okviru programa zgodnjega odkrivanja **motenj v delovanju ščitnice** in **prirojenih presnovnih bolezni** (poleg fenilketonurije od 2019 še 16 novih bolezni presnove). Z zgodnjim zdravljenjem teh bolezni lahko preprečimo okvare v razvoju otroka. Za te bolezni zgodnja diagnoza brez presejalnih testov ni mogoča.

Kri se običajno odvzame iz žile na skalpu, saj je tam občutljivost na bolečino najmanjša. Odvzame se 8 kapljic krvi na filter papir.



V kolikor potrebujete pojasnila ali imate v zvezi z navedeno obravnavo vprašanja, se lahko dodatno posvetujete z zdravnikom.

Opisana oskrba se izvaja na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki določa obvezne preventivne zdravstvene ukrepe in cepljenja (Uradni list RS, št. 19/98 s spremembami in dopolnitvami), usklajeno na Neonatalni sekciji Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva (april 2016).



Zloženko pripravili:

dr. Milena Treiber, dr. med.

Aljoša Pungartnik, dr. med.

Miranda Zel, DMS



Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Oddelek za perinatologijo

Neonatologija

OBRAVNAVA NOVOROJENČKA PO PORODU

Pojasnila za starše

Prvi pregled

Takoj po rojstvu je otrok **ocenjen** s strani babice.

V primeru poroda z večjim tveganjem (carski rez, vakuumska ekstrakcija, itd.) otroka **pediater celostno pregleda** takoj po rojstvu, sicer v nekaj urah po rojstvu.



Preventivna zdravila

V prvih urah po rojstvu novorojenček prejme 1 mg **vitamina K** v mišico za preprečevanje krvavitev po rojstvu ter **antibiotične kapljice** v oči za preprečevanje bakterijskega vnetja oči.



Presejalni testi tekom bivanja na oddelku

Test sluha (TEOAE) se izvaja z meritvijo zvočnega sevanja notranjega ušesa. Zgodnje odkrivanje motenj sluha omogoči zgodnjo obravnavo in s tem optimalnejši razvoj otroka.



Meritev nasičenosti krvi s kisikom s pulznim oksimetrom na okončinah za zgodnje odkrivanje prirojenih srčnih napak. Meritev se opravi v starosti vsaj 24 ur.



Pregled pred odpustom in ostali presejalni testi

V starosti vsaj 48 ur, ali pred odpustom, otroka ponovno celostno pregleda pediater. Opravijo se še preostali presejalni testi:

Presvetlitev očesnih medijev za zgodnje odkrivanje prirojene sive mreže. S pravočasno obravnavo lahko ohranimo otrokov vid.



Ultrazvočni pregled kolkov za ugotavljanje pravilnosti razvoja kolkov. Glede na prvi izvid po rojstvu se opravi kontrolni UZ pregled pri ortopedu v starosti 2-6 tednov.

