

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

NAVODILO ZA SAMOAPLIKACIJO DIPHERELINE AMPUL
0,1 mg

DIPHERELINE JE V OBLIKI PRAŠKA (VIALA) IN RAZTOPINE.

ZAČETEK UPORABE

Pričetek uporabe kot je določeno na navodilu za pripravo ciklusa. Ne prekine se do STOP injekcije oziroma kot predpiše zdravnik.

ZA KAJ SE UPORABLJA ?

Uporablja se za zdravljenje ženske neplodnosti in se kombinira z drugimi hormoni (gonadotropini) v postopku izventelesne oploditve (IVF).

KAKO UPORABLJAMO ZDRAVILO ?

a) odmerjanje

1 prah (viala) + 1 raztopina 1x dnevno, vedno ob istem času.
Zdravilo, brizgalke, igle dobite pri nas v ambulanti.
Alkohol za razkuževanje, gobice lahko nabavite v lekarni.

b) priprava zdravila

- umijte si roke,
- na čisti površini si pripravite vse kar potrebujete za injiciranje :
1 prah (steklenička), raztopino (ampula), 1 brizgalko, iglo za pripravo zdravila (rdeča) in iglo za injiciranje (rjava), 3 gobice navlažene z alkoholom, posodo za ostre predmete.



- vzemite raztopino (rahlo krcnite vrh ampule, da vsa tekočina steče v spodnji del ampule);
- nato prelomite vrat ampule (barvna oznaka);
- vzemite brizgalko(ne dotikajte se ožjega dela);
- vzemite iglo (rdečo), ne odstranite zaščitnega pokrova ter jo pritrdite na brizgalko;
- odstranite zaščitni pokrovček z vialo (gumijasti zamašek očistite z alkoholno blazinico);
- iglo, ki je na brizgalki vstavite v tekočino in izvlecite vso vsebino v brizgalko;
- potisnite iglo v sredino gumijastega zamaška in iztisnite vso tekočino v vialo, nato večkrat premešajte, da se prah raztopi;
- povlecite celotno vsebino iz vialo v brizgalko, da jo popolnoma izpraznite;
- zamenjajte rdečo iglo z rjavo (za injiciranje) in iztisnite zrak in zračne mehurčke.

c) injiciranje

- obrišite izbrano mesto z dvema alkoholnima blazinicama;
- z eno roko naredite kožno gubo, z drugo roko pa injicirajte zdravilo pod kožo pod kotom od 45 - 90°;
- injekcijo si dajte v spodnji del trebuha (pod popkom);
- po uporabi brizgalko in stekleničko zavržite v smeti, igli zaščitite s pokrovčkom in ju shranite v posodico za ostre predmete le to pa ob naslednji ultrazvočni kontroli prinesite nazaj v delitev terapije.

SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte pri sobni temperaturi do 25°C.